



Rodné číslo:		☐ muž ☐ žena	hl. diagnóza (MKCH):	1.	Kód PZS odosielateľa:	
Priezvisko:			pridružená diagnóza:	2.	Kód LEKÁRA odosielateľa:	
Meno:				3.	Kód PZS odporúčajúceho:	
Bydlisko:			žiadanka vystavená:		Kód LEKÁRA odporúčajúceho:	
ID hospitalizačného prípadu:			kód poisťovne:		Pečiatka a podpis lekára	
EÚ poisťovňa: (priložiť kópiu ZP)		Typ poskytnutej zdrav. starostlivosti:	dátum odberu:			
Identifikačné číslo pacienta		Kód krajiny EU:	čas odberu:			
E-mail pacienta:			posledná menš.:			
			Fakturovať:	☐ zdravot. zariadenie		

VSMB

Druh materiálu:

☐ sérum ☐ moč ☐ K-EDTA ☐ likvor ☐ tampón ☐ BAL ☐ stolica ☐ iný materiál

Bakteriologická nepriama diagnostika ^{0,2}	Virologická nepriama diagnostika ^{0,2}	Molekulárno-biologické metódy ^{1,2,3}	☐ <i>Ch. trachomatis</i> , <i>N. gonorrhoeae</i> (DNA PCR)
☐ lymfická borelióza (IgM, IgG) ☐ imunoblot	☐ anti - HIV 1, 2, O a HIV1 Ag p24	☐ HCV (RNA PCR) ⁰ ☐ genotyp ⁰	☐ <i>Mycoplasma hominis</i> / <i>M. genitalium</i> (DNA PCR)
☐ syfilis (TPA, resp. RPR, TPPA) ☐ imunoblot	☐ Herpes simplex vírus 1, 2 (IgM, IgG)	☐ HBV (DNA PCR) ⁰	<i>Ureaplasma urealyticum</i> / <i>U. parvum</i> (DNA PCR)
☐ <i>Helicobacter pylori</i> (IgG) ☐ imunoblot ⁵	☐ Varicella-zoster vírus (IgM, IgG)	☐ HIV 1 RNA PCR (vybraní pac.)	☐ <i>Trichomonas vaginalis</i> (DNA PCR)
☐ <i>Chlamydia trachomatis</i> (IgA, IgG)	☐ Cytomegalovírus (IgM, IgG)	☐ Herpes simplex vírus 1 (DNA PCR)	☐ likvorový panel multiplex PCR (vybraní pac.)
☐ <i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Chlamydia psittaci</i> , <i>Chlamydia pneumoniae</i> (IgA, IgG)	☐ CMV avidita IgG (gravídita, resp. dohovor)	☐ vírusová nálož ⁶	☐ respiračný panel multiplex PCR (vybraní pac.)
☐ <i>Chlamydia pneumoniae</i> (IgA, IgG)	☐ Epsteinov-Barrovej vírus	☐ Herpes simplex vírus 2 (DNA PCR)	☐ pneumonia panel multiplex PCR (vybraní pac.)
☐ <i>Mycoplasma pneumoniae</i> (IgM, IgG)	☐ heterofilné protilátky (Paul.-Bunnell, r., IM-test)	☐ Varicella-zoster vírus (DNA PCR)	☐ Influenza A/B / RSV (RNA PCR)
☐ <i>Bordetella pertussis</i> (IgA, IgG)	☐ vírus rubeoly (IgM, IgG)	☐ vírusová nálož ⁶	☐ SARS CoV2 (RNA PCR)
☐ <i>Bartonella henselae</i> / <i>quintana</i> (IgM, IgG)	☐ vírus osýpok IgM ☐ IgG	☐ Cytomegalovírus (DNA PCR)	☐ <i>Toxoplasma gondii</i> (DNA PCR)
☐ <i>Listeria monocytogenes</i> / <i>Listeria ivanovii</i>	☐ vírus parotitidy IgM ☐ IgG	☐ vírusová nálož	☐ <i>Pneumocystis jirovecii</i> (DNA PCR)
☐ <i>Brucella abortus</i>	☐ vírus klieštovej encefalitidy IgM ☐ IgG	☐ Epsteinov-Barrovej vírus (DNA PCR)	☐
☐ <i>Francisella tularensis</i>	☐ anti-SARS CoV 2 N prot. IgM, IgG ☐ IgA	☐ vírusová nálož	☐
☐ <i>Yersinia enterocolitica</i> (IgA, IgG)	☐ anti-SARS CoV 2 S1, S2 prot. (IgG)	☐ Herpesvírus ľudí 6 (DNA PCR)	Predoperačná sérológia⁰
☐ protilátky proti salmonelám (Widalova r.)	☐	☐ Herpesvírus ľudí 8 (DNA PCR)	☐ HBsAg, HIV, syfilis
Vírusové hepatitidy⁰	Dôkaz antigénu²	☐ Adenovírus (DNA PCR)	☐ HBsAg, HIV, syfilis, anti-HCV
☐ anti-HAV IgM ☐ anti-HAV total	☐ respiračné adenovírusy (nosohltan)	☐ Parvovírus ľudí B19 (DNA PCR)	
☐ HBsAg ☐ anti-HBs	☐ RS vírus (nosohltan)	☐ BK polyomavírus a JC polyomavírus (DNA PCR)	
☐ HBeAg ☐ anti-HBe	☐ chripka A, B (nosohltan)	☐ <i>Borrelia</i> spp. (DNA PCR)	
☐ anti-HBc total ☐ anti-HBc IgM	☐ rotavírus, adenovírus, astrovírus, norovírus (stolica)	☐ <i>Chlamydia pneumoniae</i> (DNA PCR)	
☐ anti-HCV ☐ imunoblot ⁴	☐ <i>Helicobacter pylori</i> (stolica)	☐ <i>Mycoplasma pneumoniae</i> (DNA PCR)	
☐ anti-HEV IgM a IgG	☐	☐ <i>Bordetella pertussis</i> / <i>B. paraptussis</i> (DNA PCR)	

PARAZITOLOGICKÁ SÉROLÓGIA

Nepriamy dôkaz ^{0,2}	☐ amebóza (<i>Entamoeba histolytica</i>)	Dotazník na analýzu tkanivových parazitóz	konsumácia nedostatočne teplom spracovaného mäsa ☐ nie ☐ áno %
☐ toxokaróza	☐ toxoplazmóza	trvanie ochorenia:	
☐ trichinelóza	☐ leishmanióza	klinické prejavy:	pobyt v zahraničí ☐ nie ☐ áno
☐ echinokokóza - hydatidóza (<i>E. granulosus</i>)	☐ cysticerkóza	eozinofília	kde:
☐ echinokokóza - alveokokóza (<i>E. multilocularis</i>)	☐ iné - uviesť:	leukocyty počet: ☐ nie ☐ áno %	kedy:
☐	☐		kontakt so zvieratom ☐ nie ☐ áno
☐	☐		
☐	☐		

Odporúčaný typ odberu podľa druhu odobratého materiálu:

⁰ krv do skúmavky s gélom; ¹ odber do K-EDTA; ² odber do prázdnej sterilnej skúmavky;
³ odber do sterilnej skúmavky s cca 200 µl fyz. roztoku (len pre tkanivo); ⁴ po dohovore s laboratóriom; ⁵ iba pri pozitívnej Ab a pri chronickej gastritíde rezistentnej na liečbu;
⁶ iba z tekutých materiálov

Klientske centrum
0800 00 30 30

www.medirex.sk

Používajte iba
odberový systém:

● SARSTEDT Monovette®

■ BD Vacutainer®

MEDIREX GROUP
Centrálné laboratórium BA
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava

MEDIREX GROUP
Centrálné laboratórium NR
Novozámocká 67
949 05 Nitra-Horné Krškany

MEDIREX GROUP
Centrálné laboratórium KE
Magnezitárska 2/C
040 13 Košice

