


Vypíňat paličkým písmom tmavým perom.

interný kód laboratória

Rodné číslo:		☐ muž ☐ žena	hl. diagnóza (MKCH):	1.	Kód PZS odosielateľa:	
Priezvisko:			pridružená diagnóza:	2.	Kód LEKÁRA odosielateľa:	
Meno:				3.	Kód PZS odporúčajúceho:	
Bydlisko:			žiadoska vystavená:		Kód LEKÁRA odporúčajúceho:	
ID hospitalizačného prípadu:			kód poisťovne:		Pečiatka a podpis lekára	
EÚ poisťovňa: (priložiť kópiu ZP)		Typ poskytnutej zdrav. starostlivosti:	dátum odberu:			
Identifikačné číslo pacienta		Kód krajiny EU:	čas odberu:			
E-mail pacienta:			Fakturovať: ☐ zdravotnícke zariadenie			

ATB terapia:		Poznámka lekára:	
Gravidita:			

Počet vzoriek na objednávku:			
☒ Bakteriologická kultivačná analýza a citlivosť relevantných patogénnych kmeňov			
☐ výter z tonzíl	a ☐ <i>Streptococcus pyogenes</i> antigén ¹	Žalúdočná sliznica na <i>Helicobacter pylori</i>	
☐ výter z nosa		☐ ureázový test ☐ mikroskopický dôkaz ☐ kultivácia + citlivosť ³	
☐ spútum		☐ dialyzát	
☐ bronchoalveolárna laváž	☐ odsatý sekrét	☐ katéter (aký)	
☐ moč - semikvantitatívne stanovenie bakteriúrie (KVB)		☐ kanyla (aká)	
☐ spontánny ☐ cievkovany ☐ z permanent. katétra		☐	
☐ výter z rektu ☐ stolica ☐ skrining CPE ⁷		Dôkaz antigénu alebo toxínu	
oko ☐ pravé ☐ ľavé		☐ <i>Helicobacter pylori</i> antigén zo stolice	
zvukovod ☐ pravý ☐ ľavý		☐ <i>Escherichia coli</i> O157:H7 antigén zo stolice	
stredné ucho ☐ pravé ☐ ľavé		☐ <i>Yersinia enterocolitica</i> antigén zo stolice	
likvor ☐ kultivačne ☐ voľné antigény		☐ <i>Campylobacter spp.</i> antigén zo stolice	
Hemokultúra, odber z:		☐ <i>Clostridium difficile</i> antigén a toxín A a B ² zo stolice	
☐ aeróbna ☐ anaeróbna ☐ mykotická		☐ <i>Streptococcus pneumoniae</i> antigén v moči	
☐ ster z kože miesta vpichu pre odber na hemokultúru		☐ <i>Legionella pneumophila</i> antigén v moči	
☐ rana (aká):	a ☐ anaeróbne	☐	
☐ punkčat (aký):		Kultivačná analýza urogenitálneho systému	
a ☐ <i>N. gonorrhoeae</i>	a ☐ anaeróbne	☐ pošva	a ☐ <i>N. gonorrhoeae</i> ⁴ a ☐ anaeróbne
☐ hnis (aký):	a ☐ anaeróbne	☐ cervix	a ☐ <i>N. gonorrhoeae</i> ⁴ a ☐ anaeróbne
☐ absces (aký):	a ☐ anaeróbne	☐ uretra	a ☐ <i>N. gonorrhoeae</i> ^{4,5} a ☐ anaeróbne
☐ ster (aký):	a ☐ anaeróbne	☐ ejakulát ⁵	a ☐ anaeróbne
☐ výter z rany	a ☐ anaeróbne	☐ iný	a ☐ <i>N. gonorrhoeae</i> ^{4,5} a ☐ anaeróbne
☐ výter z dekubitu	a ☐ anaeróbne	<i>Mycoplasma, Ureaplasma</i> ☐ pošva ☐ uretra ☐ moč ⁸	
☐ výter z ložiska (aký):	a ☐ anaeróbne	☐ <i>Trichomonas vaginalis</i> ⁶	
☐ iný materiál (aký):	a ☐ anaeróbne	Skrining <i>Streptococcus agalactiae</i> kultivačne ⁶ ☐ vagino-rektálny výter	

¹ Vykonáva sa z jedného výteru.² Toxíny *C. difficile* A a B sa stanovujú iba vo vzorkách s dokázanou prítomnosťou antigénu.³ Iba u pacientov po zlyhaní liečby antibiotikami.⁴⁵ *N. gonorrhoeae* u mužov vyšetrujeme automaticky.⁶ Optimálne dva výtery, ak je požadovaná aj štandardná kultivácia z urogenitálneho systému.⁷ CPE - karbapenemázu produkujúce baktérie⁸www.medirex.skKlientske centrum
0800 00 30 30MEDIREX GROUP
Centrálne laboratórium BA
Galvaniho 17/C
821 04 BratislavaMEDIREX GROUP
Centrálne laboratórium NR
Novozámocká 67
949 05 Nitra-Horné KrškanyMEDIREX GROUP
Centrálne laboratórium KE
Magnezitárska 2/C
040 13 Košice



BA123450 0