

Vypíňať paličkovým písmom tmavým perom.

interný kód laboratória

Rodné číslo:		☐ muž ☐ žena	hl. diagnóza (MKCH):	1.	Kód PZS odosielateľa:	
Priezvisko:			pridružená diagnóza:	2.	Kód LEKÁRA odosielateľa:	
Meno:				3.	Kód PZS odporúčajúceho:	
Bydlisko:			žiadamka vystavená:		Kód LEKÁRA odporúčajúceho:	
ID hospitalizačného prípadu:			kód poisťovne:		Pečiatka a podpis lekára	
EÚ poisťenci: (priložiť kópiu ZP)		Typ poskytnutej zdrav. starostlivosti:	dátum odberu:			
Identifikačné číslo pacienta		Kód krajiny EU:	čas odberu:			
E-mail pacienta:		Fakturovať:	☐ zdravotnícke zariadenie			

ATB terapia:		Poznámka lekára:	
Gravidita:			

Počet vzoriek na objednávke:			
☒ Bakteriologická kultivačná analýza a citlivosť relevantných patogénnych kmeňov			
☐ výter z tonzíl	a	☐ <i>Streptococcus pyogenes</i> antigén ¹	Žalúdočná sliznica na <i>Helicobacter pylori</i>
☐ výter z nosa		☐ výter z nosohltanu	☐ ureázový test + mikroskopický dôkaz ☐ kultivácia + citlivosť ³
☐ spútum			☐ dialyzát
☐ bronchoalveolárna laváž		☐ odsatý sekrét	☐ katéter (aký)
☐ moč - semikvantitatívne stanovenie bakteriúrie (KVB)			☐ kanyla (aká)
☐ spontánny	☐ cievkovany	☐ z permanent. katétra	☐
☐ výter z rektu	☐ stolica	☐ skrining CPE ⁷	Dôkaz antigénu alebo toxínu
oko	☐ pravé	☐ ľavé	☐ <i>Helicobacter pylori</i> antigén zo stolice
zvukovod	☐ pravý	☐ ľavý	☐ <i>Escherichia coli</i> O157:H7 antigén zo stolice
stredné ucho	☐ pravé	☐ ľavé	☐ <i>Yersinia enterocolitica</i> antigén zo stolice
likvor	☐ kultivačne	☐ voľné antigény	☐ <i>Campylobacter spp.</i> antigén zo stolice
Hemokultúra, odber z:			☐ <i>Clostridioides difficile</i> antigén a toxín A a B ² zo stolice
☐ aeróbna	☐ anaeróbna	☐ mykotická	☐
☐ ster z kože miesta vpichu pred odberom hemokultúry			☐ <i>Streptococcus pneumoniae</i> antigén v moči
☐ rana (aká):	a	☐ anaeróbne	☐ <i>Legionella pneumophila</i> antigén v moči
☐ punktát (aký):			Kultivačná analýza urogenitálneho systému
	a	☐ <i>N. gonorrhoeae</i>	☐ pošva a ☐ <i>N. gonorrhoeae</i> ⁴ a ☐ anaeróbne
☐ hnis (aký):	a	☐ anaeróbne	☐ cervix a ☐ <i>N. gonorrhoeae</i> ⁴ a ☐ anaeróbne
☐ absces (aký):	a	☐ anaeróbne	☐ uretra a ☐ <i>N. gonorrhoeae</i> ^{4,5} a ☐ anaeróbne
☐ ster (aký):	a	☐ anaeróbne	☐ ejakulát ⁵ a ☐ anaeróbne
☐ výter z rany	a	☐ anaeróbne	☐ iný a ☐ <i>N. gonorrhoeae</i> ^{4,5} a ☐ anaeróbne
☐ výter z dekubitu	a	☐ anaeróbne	☐ <i>Mycoplasma, Ureaplasma</i> ☐ pošva ☐ uretra ☐ moč ⁸ ☐ ejakulát
☐ výter z ložiska (aký):	a	☐ anaeróbne	☐ <i>Trichomonas vaginalis</i> ⁶ ☐ pošva ☐ uretra ☐ moč ⁸ ☐ ejakulát
☐ iný materiál (aký):	a	☐ anaeróbne	Skrining <i>Streptococcus agalactiae</i> kultivačne ⁶ ☐ vagino-rektálny výter


¹ Vykonáva sa z jedného výteru.² Toxíny *C. difficile* A a B sa stanovujú iba vo vzorkách s dokázanou prítomnosťou antigénu.³ Iba u pacientov po zlyhaní liečby antibiotikami.⁴ *N. gonorrhoeae* u žien vyšetrujeme len pri vyznačenej požiadavke.⁵ *N. gonorrhoeae* u mužov vyšetrujeme automaticky.⁶ Optimálne dva výtery, ak je požadovaná aj štandardná kultivácia z urogenitálneho systému.⁷ CPE - karbapenemázu produkujúce baktérie⁸ Prvá porcia moču

www.medirex.sk
Klientske centrum
0800 00 30 30

MEDIREX GROUP
Centrálné laboratórium BA
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava

MEDIREX GROUP
Centrálné laboratórium NR
Novozámocká 67
949 05 Nitra-Horné Krškany

MEDIREX GROUP
Centrálné laboratórium KE
Magnezitárska 2/C
040 13 Košice



Vyberte štítok - po vyplnení nalepte na ktorýkoľvek druh materiálu