

Rodné číslo:		☐ muž ☐ žena	hl. diagnóza (MKCH):	1.	Kód PZS odosielateľa:	
Priezvisko:			pridružená diagnóza:	2.	Kód LEKÁRA odosielateľa:	
Meno:				3.	Kód PZS odporúčajúceho:	
Bydlisko:			žiadamka vystavená:		Kód LEKÁRA odporúčajúceho:	
ID hospitalizačného prípadu:			kód poisťovne:		Pečiatka a podpis lekára	
EÚ poisťovňa: (priložiť kópiu ZP)		Typ poskytnutej zdrav. starostlivosti:	dátum odberu:			
Identifikačné číslo pacienta		Kód krajiny EU:	čas odberu:			
E-mail pacienta:			posledná menš.:			
			Fakturovať:	☐ zdravot. zariadenie ☐ pacient	Súhlasím s platbou za vykonané laboratórne vyšetrenie(-ia):	

VSMB

Druh materiálu:

☐ sérum ☐ moč ☐ K-EDTA ☐ líkvor ☐ tampón ☐ BAL ☐ stolica ☐ iný materiál

Bakteriologická nepriama diagnostika ^{0,2}	Varicella-zoster vírus (IgM, IgG)	Dôkaz antigénu ²	Adenovírus (DNA PCR) ☐ vírusová nálož
☐ lymfická borelióza (IgM, IgG) ☐ imunoblot	☐ Cytomegalovírus (IgM, IgG)	☐ respiračné adenovírusy (nosohltan)	☐ Chlamydia pneumoniae (DNA PCR)
☐ syfilis (TPA, resp. RPR, TPPA) ☐ imunoblot	☐ CMV avidita IgG (gravida, resp. dohovor)	☐ RS vírus (nosohltan)	☐ Ch. trachomatis, N. gonorrhoeae (DNA PCR)
☐ Helicobacter pylori (IgG) ☐ imunoblot ⁵	☐ Epstein-Barrovej vírus	☐ chrípka A, B (nosohltan)	☐ Borrelia spp. (DNA PCR)
☐ Chlamydia trachomatis (IgA, IgG)	☐ heterofilné protilátky (Paul-Bunnell, r., IM-test)	☐ rotavírus, adenovírus, astrovírus, norovírus (stolica)	☐ M. pneumoniae (DNA PCR)
☐ Chlamydia trachomatis, Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae (IgA, IgG)	☐ vírus rubeoly IgM ☐ IgG	☐ Helicobacter pylori (stolica)	☐ Mycoplasma hominis/M. genitalium (DNA PCR)
☐ Chlamydia pneumoniae (IgA, IgG)	☐ vírus osýpok IgM ☐ IgG	Molekulárno-biologické metódy^{1,2,3}	☐ Ureaplasma urealyticum/U. parvum (DNA PCR)
☐ Mycoplasma pneumoniae (IgM, IgG)	☐ vírus parotitidy IgM ☐ IgG	☐ HCV (RNA PCR) ⁰ ☐ genotyp ⁰	☐ Trichomonas vaginalis (DNA PCR)
☐ Bordetella pertussis (IgA, IgG)	☐ vírus klieštovej encefalitidy IgM ☐ IgG	☐ HBV (DNA PCR) ⁰	☐ Parvovírus ľudí B19 (DNA PCR)
☐ Bartonella henselae/quintana (IgM, IgG)	☐ anti-SARS CoV 2 N prot. IgM, IgG ☐ IgA	☐ Herpes simplex vírus 1 (DNA PCR)	☐ Bordetella pertussis/B. parapertussis (DNA PCR)
☐ Listeria monocytogenes/ Listeria ivanovii	☐ anti-SARS CoV 2 S1, S2 prot. (IgG)	☐ vírusová nálož ⁶	☐ BK polyomavírus a JC polyomavírus (DNA PCR)
☐ Brucella abortus	Vírusové hepatitidy⁰	☐ Herpes simplex vírus 2 (DNA PCR)	☐ respiračný panel multiplex PCR (vybraní pac.)
☐ Francisella tularensis	☐ anti-HAV IgM ☐ anti-HAV total	☐ Herpesvírus ľudí 6 (DNA PCR)	☐ líkvorový panel multiplex PCR (vybraní pac.)
☐ Yersinia enterocolitica (IgA, IgG)	☐ HBsAg ☐ anti-HBs	☐ Herpesvírus ľudí 8 (DNA PCR)	☐ pneumonia panel multiplex PCR (vybraní pac.)
☐ protilátky proti salmonelám (Widalova r.)	☐ HBeAg ☐ anti-HBe	☐ Cytomegalovírus (DNA PCR)	☐ HIV 1 RNA PCR (vybraní pac.) ¹
☐	☐ anti-HBc total ☐ anti-HBc IgM	☐ vírusová nálož	☐ SARS CoV2 (RNA PCR)
Virologická nepriama diagnostika^{0,2}	☐ anti-HCV ☐ imunoblot ⁴	☐ Epstein-Barrovej vírus (DNA PCR)	☐ Influenza A/B / RSV (RNA PCR)
☐ anti - HIV 1, 2, O a HIV1 Ag p24	☐ anti-HEV IgM a IgG	☐ vírusová nálož ⁶	Predoperačná sérológia⁰
☐ Herpes simplex vírus 1, 2 (IgM, IgG)	☐	☐ Varicella-zoster vírus (DNA PCR)	☐ HBsAg, HIV, syfilis
		☐ vírusová nálož ⁶	☐ HBsAg, HIV, syfilis, anti-HCV

MYKOLOGICKÁ SÉROLÓGIA

Mykologická nepriama diagnostika ^{0,2} (len pri podozrení na invazívnu mykózu)	☐ kandidový antigén (manán)	☐ aspergillový antigén (galaktomanán)	☐ dôkaz antigénu Cryptococcus neoformans
	☐ protilátky proti kandidovému manánu	☐ protilátky proti Aspergillus fumigatus	☐

PARAZITOLOGICKÁ SÉROLÓGIA

Nepriamy dôkaz ^{0,2}	Dotazník na analýzu tkanivových parazitóz	konzumácia nedostatočne teplom spracovaného mäsa ☐ nie ☐ áno % pobyt v zahraničí ☐ nie ☐ áno kde: kedy: kontakt so zvieratom ☐ nie ☐ áno
☐ toxokaróza	trvanie ochorenia:	
☐ trichinelóza	klinické prejavy:	
☐ echinokokóza - hydatidóza (E. granulosus)	eozinofília	
☐ echinokokóza - alveokokóza (E. multilocularis)	leukocyty počet: ☐ nie ☐ áno %	
☐ amebóza (Entamoeba histolytica)	Molekulárno-biologické metódy^{0,1,2}	
☐ toxoplazmóza	☐ Toxoplasma gondii (DNA PCR)	
☐	☐ Pneumocystis jirovecii (DNA PCR)	

Odporúčaný typ odberu podľa druhu odobratého materiálu:

⁰ krv do skúmavky s gélom; ¹ odber do K-EDTA; ² odber do prázdnej sterilnej skúmavky;

³ odber do sterilnej skúmavky s cca 200 µl fyz. roztoku (len pre tkanivo); ⁴ po dohovore s laboratóriom; ⁵ iba pri pozitívne Ab a pri chronickej gastritíde rezistentnej na liečbu;

⁶ iba z tekutých materiálov

Používajte iba odberový systém: ☒ SARSTEDT Monovette® ☐ BD Vacutainer®

www.laboratornadiagnostika.sk

MEDIREX GROUP
Centrálné laboratórium BA
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
clba@medirexgroup.sk

MEDIREX GROUP
Centrálné laboratórium KE
Magnezitárska 2/C
040 13 Košice
clke@medirexgroup.sk

Klientske centrum
0800 00 30 30

